


drainage / punctie / biopsie / nefrostomie



Bij deze patiënt is een drainage / punctie / biopsie / nefrostomie verricht.

Deze procedure vond plaats op

en is om uur beëindigd.

Nazorg na terugkomst op de afdeling

- Strikte bedrust gedurende twee uren na de procedure
- Pols en tensie meten bij:
 - Terugkomst
 - Na 15 minuten
 - Na 30 minuten
 - Vervolgens elk half uur gedurende twee uur
- Indien voor een procedure een iv-infuus is ingebracht, kan dit bij een normale pols en tensie na twee uur verwijderd worden.
- Bij complicaties (zoals bv. sterke tensiedaling of stijging van de polsfrequentie) de uitvoerend **radioloog** (op diens sein en tijdens de bereikbaarheidsdienst de dienstdoende radioloog via de telefoniste) of de **angiolaborant** (tel. 1300) waarschuwen.
- Urineproductie via katheter noteren.
Indien er een blaaskatheter aanwezig is, dan ook deze urine meten.
Het is normaal dat de urine de eerste paar dagen roodgekleurd is.
- Antibioticabeleid in overleg met de behandelend specialist.

| | | | |
|-------------------|---|----------------|------|
| De procedure werd | ○ | Dr. Hummel | 5777 |
| uitgevoerd door: | ○ | Dr. Krabbe | 5778 |
| | ○ | Dr. Elsen | 5781 |
| | ○ | Dr. Groeneveld | 5779 |
| | ○ | Dr. Rademakers | 5780 |
| | ○ | Dr. Chin | 5782 |