

Marcaïnisatie van het heupgewricht

Onderzoek met verdoving van het heupgewricht

1 Inleiding

Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om een onderzoek van de heup te ondergaan om zo de klachten in de heup en/of benen te verklaren.

Marcaïnatie is een onderzoek waarbij een injectie met verdovende vloeistof (Marcaïne) in het heupgewricht gegeven wordt. Soms wordt daarbij ook een ontstekingsremmende stof (Kenacort=Cortison) ingespoten. Door deze injectie die in dagverpleging wordt gedaan (ook wel artrocentese genoemd) wordt het heupgewricht tijdelijk verdoofd. Dit wordt gedaan om te testen of de pijnklachten na de injectie minder worden of verdwijnen. Pijnklachten in de heup kunnen verschillende oorzaken hebben. Door dit onderzoek is het mogelijk om vast te stellen of uw pijnklachten veroorzaakt worden door een aandoening van het heupgewricht, of door een mogelijke andere aandoening. Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

2 Voorbereiding op het onderzoek

Aandachtspunten

- Als u bloedverdunners gebruikt, moet u misschien deze vóór de operatie tijdelijk stoppen. ***Doe dit nooit op eigen initiatief, maar overleg altijd met de arts die de bloedverdunners heeft voorgeschreven of met uw orthopedisch chirurg.***
- Als u weet dat u overgevoelig bent voor jodium en/of contrastvloeistof moet u dit melden aan de arts die het onderzoek uitvoert.
- U bent niet in staat om zelf naar huis te rijden na het onderzoek. Regel daarom van te voren vervoer naar huis.

Als u andere medicijnen gebruikt, kunt u die innemen zoals gebruikelijk. Verder is geen speciale voorbereiding nodig. U kunt gewoon eten en drinken. Heeft u heel veel pijn dan is er eventueel narcose mogelijk.

3 Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de operatie afdeling. Voordat het onderzoek begint, neemt u plaats op de operatietafel. Boven deze tafel hangt een röntgendoorlichtingsapparaat. De arts desinfecteert en verdooft de huid en brengt onder röntgendoorlichting de injectienaald in het heupgewricht. Om er zeker van te zijn dat de injectienaald in het heupgewricht zit, wordt een beetje contrastmiddel in het gewricht gespoten. Daarna wordt de verdovingsvloeistof via dezelfde naald in het heupgewricht gespoten. Het kan zijn dat hieraan ook ontstekingsremmende vloeistof is toegevoegd. Uw orthopeed legt u uit wat voor u van toepassing is.

4 Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

5 Na de injectie

De pijnstillende stof die is ingespoten in de heup, werkt ongeveer 2 uur. Hierna is het juist de bedoeling dat u het gewricht zo normaal mogelijk belast om erachter te komen of de klachten afnemen of geheel verdwijnen.

6 Uitslag

U bespreekt uw bevindingen met uw behandelend arts tijdens een controle afspraak.

7 Mogelijke risico's en complicaties

Hoewel de kans op een complicatie klein is kan er een bloeding, infectie of een verminderd gevoel in het boven been optreden. Soms is er sprake van kortdurend krachtsverlies of onzekerheid bij het lopen.

8 Tot slot

Kunt u om dringende redenen uw afspraak niet nakomen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten bij het Planbureau via telefoonnummer 0513 685 209.