

Ooglid correctie

Inleiding

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De meest voorkomende afwijking van de bovenoogleden is een teveel aan huid van het ooglid. Deze afwijking kan beperking van het gezichtsveld, vermoeidheid en irritatie van de ogen veroorzaken. Een operatie kan uitkomst bieden. De ingreep kan in verreweg de meeste gevallen het beste door uw oogarts verricht worden.

Oorzaak

De huid van de oogleden is dun en daardoor gevoelig voor uitrekking. Veel mensen ontwikkelen dan ook in de loop der jaren een teveel aan huid in de oogleden. Wanneer de huid over de rand van het ooglid hangt, veroorzaakt dit een beperking van het bovenste gezichtsveld. Vaak verslapt niet alleen de huid, maar ook het onderliggende bindweefsel. Hierdoor kan vet uit de oogkas naar voren komen. Dit heeft zwelling van het ooglid tot gevolg.

Operatie

De operatie geschiedt onder plaatselijke verdoving. Het teveel aan huid en vet wordt verwijderd. Direct na de ingreep krijgt u vaak even een ijsbril op om zwelling te beperken. De hechting waarmee het wondje wordt gesloten, moet na een week weer worden verwijderd op de polikliniek Oogheelkunde. Het litteken van de operatie valt weg in de huidplooi.

Complicaties

Een lichte asymmetrie (ongelijkheid) in de hoogte en vorm van de huidplooi of de littekens kan voorkomen. Ernstige complicaties als een wondinfectie of een bloeding achter de oogbol komen zelden voor.

Kosten

Wanneer het teveel aan huid een beperking van het gezichtsveld veroorzaakt, dan is er sprake van een medische indicatie en wordt de operatie door uw verzekering vergoed. In het algemeen zal uw oogarts tevoren toestemming voor de ingreep aan uw zorgverzekeraar vragen.

Bij verhindering

Wilt u bij verhindering tijdig bellen.

Het telefoonnummer is:

0513 68 54 20