

Maag en/of slokdarm onderzoek

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	1
2	Doel van het onderzoek.....	1
3	Vorbereiding.....	1
4	Voor het onderzoek.....	2
5	Tijdens het onderzoek.....	2
6	Kinderen.....	3
7	Na het onderzoek.....	3
8	Uitslag	3
9	Tot slot	3

Belangrijk

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op!

Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10 dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.

1 Inleiding

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een onderzoek van de maag en/of de slokdarm. Na overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Via deze folder willen wij u informatie geven over dit onderzoek. De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog (arts die het onderzoek verricht) een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden.

2 Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het zichtbaar maken van de maag en/of de slokdarm met behulp van een contrastmiddel (bariumpap). Hiermee kan mogelijk de oorzaak van uw klachten worden vastgesteld.

3 Voorbereiding

Het is van belang dat er tijdens dit onderzoek zo weinig mogelijk voedselresten in de maag en de slokdarm aanwezig zijn. Daarom moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf 22.00 uur op de avond voorafgaand aan het onder-

zoek niet meer mag eten, drinken en roken tot na het onderzoek. Ook mag u geen kauwgom meer kauwen.

Medicijnen

Medicijnen mag u op de gebruikelijke manier innemen.

Dieet

Raadpleeg uw behandelend arts of diëtist wanneer u voor uw gezondheid een dieet volgt. Dit is in ieder geval noodzakelijk als u diabetespatiënt bent.

4 Voor het onderzoek

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.

U wordt verzocht zich tien minuten voor de afgesproken tijd bij de aanmeldzuil aan te melden.

U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat u uit kunt trekken. De laborant haalt u via de andere deur uit het kleedkamertje.

5 Tijdens het onderzoek

U wordt verzocht plaats te nemen op de onderzoekstafel.

U drinkt vervolgens op aanwijzingen van de radioloog de beker bariumpap leeg. Van elk deel van de maag en/of slokdarm worden opnames gemaakt. De radioloog vraagt u om in verschillende richtingen te draaien en tijdens het maken van de opnames uw adem stil te houden en niet te bewegen. Soms wordt tijdens het onderzoek met een soort pollepel op uw buik gedrukt.

6 Kinderen

Indien er van uw kind (baby) slokdarm- en/of maagfoto's gemaakt moeten worden is het raadzaam een flesje met voeding of een ander drankje wat het kind lekker vindt, mee te nemen. De bariumpap kan hiermee gemengd worden.

Het onderzoek zal ongeveer een kwartier duren.

7 Na het onderzoek

Na het onderzoek kan uw ontlasting nog enkele dagen wit van kleur zijn. Om de pap zo snel mogelijk kwijt te raken en om verstopping te voorkomen moet u de eerste twee dagen minimaal een liter extra drinken. Wanneer u last heeft van een trage stoelgang kunt u eventueel een laxermiddel (Bisacodyl) innemen.

U kunt zich na het onderzoek soms slap voelen. Daarom adviseren wij u om iets te eten mee te nemen.

8 Uitslag

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag zult krijgen.

9 Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie, tel: 0513 685 771.

1-08-2017/19870

