

Longfunctieafdeling, route 26, 1^{ste} etage
 Thialfweg 44
 8441 PW Heerenveen
 Tel: 0513 – 685 685 toestel 1703

Geachte heer/mevrouw,

Om het longfunctieonderzoek goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat u tijdig het gebruik van onderstaande (long)medicatie staakt.

6 uur van te voren staken:

Merknaam	Generieke naam	Werkingsduur
Airomir	Salbutamol	2-4 uur
Bricanyl	Terbutaline	Max 6 uur
Ventolin	Salbutamol	2-4 uur

12 uur van te voren staken:

Merknaam	Generieke naam	Werkingsduur
Atrovent	Ipratropium	3-6 uur (poeder) 4-8 uur (verneveling)
Berodual	Fenoterol+ Ipratropium	Max 8 uur
Combivent	Salbutamol + Ipratropium	Max 8 uur

36 uur van te voren staken:

Merknaam	Generieke naam	Werkingsduur
Aerivo	Salmeterol + Fluticason	12 uur
AirFluSal Forspiro	Salmeterol + Fluticason	12 uur
Atimos	Formoterol	12 uur
Bufoler Easyhaler	Formoterol + Budesonide	12 uur
Busalair	Salmeterol + Budesonide	12 uur
Duaklir Genuair	Acidinium + Formoterol	12 uur
DuoResp Spiromax	Formoterol + Budesonide	12 uur
Eklira Genuair	Acidinium	12 uur
Elpenhaler	Salmeterol + Fluticason	12 uur
Flutiform	Formoterol + Fluticason	12 uur
Foradil	Formoterol	12 uur
Foster	Formoterol + Beclomethason	12 uur
Oxis	Formoterol	12 uur
Semprex	Acrivastine	Niet bekend
Seretide	Salmeterol + Fluticason	12 uur
Serevent	Salmeterol	12 uur
Singulair	Montelukast	Niet bekend
Symbicort	Formoterol + Budesonide	12 uur

48 uur van te voren staken:

Merknaam	Generieke naam
Daxas	Roflumilast Actieve metaboliet
Onbrez	Indacaterol
Relvar Ellipta	Fluticasonfuroaat/vilanterol
Striverdi	Olodaterol
Theolair Retard	Theofylline
Unilair	Theofylline

168 uur (één week) van te voren staken:

Merknaam	Generieke naam
Anoro	Umeclidinium/vilanterol
Bevespi Aerosphere	Glycopyrronium/Formoterol
Incruse Ellipta	Umeclidinium
Seebri	Glycopyrronium
Spiriva	Tiotropium
Spiolto	Tiotropium/Olodaterol
Tiotrus Zonda	Tiotropium
Trelegyl Ellipta	Fluticason/Vilanterol/Umeclidinium
Trimbow	Beclometasondipropionaat/ formoterolfumaraatdihydraat/ Glycopyrronium
Trixeo Aerosphere	Budesonide/ Glycopyrronium formoterolfumaraatdihydraat
Ultibro	Indacaterol/Glycopyrronium
Xotema	Indacaterol/Glycopyrronium

N.B. bij gebruik van een antibiotica- en/of prednisonkuur kan de test helaas niet doorgaan. Neemt u contact op met de longfunctieafdeling.

Het kan zijn dat op verzoek van de longarts bepaalde medicatie juist moet worden doorgebruikt, mocht dit het geval zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek.

Het is niet nodig om te stoppen met:

merknaam	Generieke naam
Qvar	Beclometason
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Alvesco	Ciclesonide